

SECTIONS ET CLASSES

OMJ/COM ZWOLLE 2019

SECTIES EN KLASSEN

OMJ/COM ZWOLLE 2019

SECTION P - CAILLES - COLINS P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS) QUAILS AND PARTRIDGES (1/2 YEARS RINGED)			Hoofdgroep P - Grondvogels - Kwartels en patrijzen 1 of 2 jaar oud Ringen 2017 en 2018	
	Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. <u>Le nom latin est indispensable.</u> Les oiseaux panachés-frisés ne sont pas admis			maximaal 5 enkelingen per soort per inzender per klasse worden geaccepteerd Latijnsenaam is bindend Bonte vogels of gefriseerde vogels worden niet geaccepteerd
Stam 4 Stam of 4	Section P CAILLES - COLINS - QUAILS AND PARTRIDGES		Indiv duel Single	Section P CAILLES - COLINS - QUAILS AND PARTRIDGES
P 1	<i>Coturnix chinensis</i> Phenotype sauvage		P 2	Chinese dwergkwartel wildkleur
P 3	<i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis toutes les mutation 1 dessin sauvag : opale , brune et isabelle 2 facteur mosaïque : sauvage ,opale , Brune , Isabelle 3 gemelaniseerd patroon zonderkeeltekening 4 autres phénotypes Blanche , Tête noire , poitrine rouge etc</i>		P 4	Chines dwergkwartel : alle mutaties : natuurtekening in Opaal , Bruin en Isabel . Mozaïkfactorige : wildkleur , Opaale , bruin en Isabel ; gemelaniseerde zonder keeltekening , Wit , Zwartkop , roodborst , enz..
P 5	<i>Coturnix Japonica</i> Phenotype sauvage		P 6	Japane kwartel wildkleur
P 7	<i>Coturnix Japonica toutes les mutations : 1 Patron a lignes ; Brune , Rousse , isabell , jaune 2 mélanique simple facteur (à lignes) 3 mélanique double facteur 4 patron mosaïque avec ou sans double collier 5 autres phénotypes : Gris Blanc ,tête colore , etc</i>		P 8	Japane kwartel alle mutaties :Lijnpatroon : Bruin , Ros , Isabelle et jaune . 2 gemelaniseerd enkel factor 3 Gemelaniseerden dubbele factor 4 mozaïeken met of zonder dubbele collier 5 andere phénotypes Grijs , wit , gekleurde kop , enz)
P 9	<i>Coturnix virginianus ssp CV Ridgwai(colin de Virginie)</i> Phenotype sauvage		P 10	C Virginianus (ook Ridgwai) Wildkleur
P 11	<i>Colinus virginianus ssp dont C.v.ridgwai toutes les mutations 1 Colinus virginianus mutation mosaïque , grise , autre..) 2 C Virginianus à tête noire</i>		P 12	C Virginianus (ook Ridgwai) mutatie mozaïek , Grijs , en andere 2 colinus virginianus zwartkop
P 13	<i>Coturnix coturnix (caile de Blé phénotype sauvage</i>		P 14	Coturnix coturnix Wildkleur
P 15	Autres coturnix (delegorguei , coromandelica , pectorallis , ypsilophora , adamsonii , phénotype sauvage		P 16	Coturnix andere (delegorguei , cormandelica , pectoralis , ypsilophora , adamsonii Wildkleuri
P 17	Genus <i>Perdicula</i> Phénotype sauvage 1 P asiatica 2 P Argoondah 3 P erythrorhyncha 4 P manipuensis nCallipepla (californica-gambellii) Phenotype sauvage		P 18	Genus <i>Perdicula</i> WILDKLEUR 1 P asiatica 2 P argoondah , 3 P erythrorhyncha , 4 P manipurensis
P 19	Genus <i>Arborophila</i> (18) genus <i>Rollulus</i> (3) , Caloperdix , Haematotyx Wildkleur 1 A Torqueola 2 A Gingica 3 A Brunneopectus 4 A Javanica 5 A chloropus 6 Rollulus rouloul 7 Caloperdix oculate 8 Haematortyx sanuinceps		P 20	zie hiernaast Wildkleur

P 21	<i>Genus Francolinus (5) Peliperdix (4) Sceroptia (7) Pternists (23) Dendroperdix sephaena (1) Phénotype sauvageus Dendrortyx (barbatus-macrourea-leucophrys) Genus Philortyx-dactylortyx-rhynchortyx Phenotype sauvage</i>
P 23	<i>Genus Alectoris (chukar-gambra-melanocephala-magna-philbyi-rufa) Genus Perdix (dauurica-hodgsoniae-perdix) Genus Ammoperdix (griseogularis heyi) Genus Margaroperdix (madagarensis) Genus Melanoperdix (nigra) Genus Rhizothera (longirostris) Phenotype sauvage</i>
P 25	<i>Genus Anurophasis , Galloperdix (3) Xenoperdix (1) , Bambusicola Lerwa (1) tetraophasis (2) Tetraogalus (5) Phénotype sauvages-Caloperdix-Haematortyx Phenotype sauvage</i>
P 27	<i>Callipepla californica , C gambelli Phénotype sauvagespp (coqui-shelleyi-hartlaubi-afer ...) Phenotype sauvage</i>
P 29	<i>Callipepla squamarta , C douglasii , Oreortyx pictus Phénotype sauvage Genus Odontophorus (capueira-melanonotus , ...) Phenotype sauvage</i>
P 31	<i>Genus Colinus , Cyrtonyx , Dendroortyx , Philortyx , Dactylortyx , Rhynchortyx , Odontophorus , Tocros , Psilopactus Phénotype sauvage yxrAnurophasis-Galloperdix- Xenoperdix-Bambusicola- Ptilopachus-Lerwa-Tetraophasis-Tetraogallus Phenotype sauvage</i>
P 33	Mutations des classes P 13 à P 32
P 35	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)
Remarques	
les listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives Elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours Référence taxonomique: systématique établie par	

P 22	zie hiernaast Wildkleur
P 24	Genus Alectoris o.a. Chuca r steen patrijs, barbarijse patrijs, Arabische zwartkop steenpatrijs, Przevalski's steen patrijs,Philby steenpatrijs, Rode patrijs ,Genus Perdix o.a.: Baard patrijs, Tibetaanse patrijs , patrijs Genus Ammoperdix o.a.: Perzische zandpatrijs, Arabische zandpatrijs. Genus Margaroperdix o.a.: Madagaskar patrijs. Genus Melanoperdix o.a.: Zwarte bospatrijs, Genus Rhizothera o.a: Indische bospatrijs Alleen de wildkleuren van deze soorten
P 26	zie hiernaast Wildkleur
P 28	zie hiernaast Wildkleur
P 30	zie hiernaast Wildkleur
P 32	zie hiernaast Wildkleur
P 34	Alle mutaties van vogels benoemd in de klassen P 13tot P 32 8 en 17 t/m 32
P 36	Nieuwe mutaties onder studie (geen toekenning van medailles)
Toelichting	
De genoemde soorten zijn niet geheel volledig het betreft de soorten die veelvuldig op shows aanwezig zijn	

	SIBLEY et MONROE («Distribution and taxonomy of birds of the world» 1990)
--	--

	Wetenschappelijke benamingen zijn bepaald aan de hand van de lijst van Sibley en Monroe. (« Distribution and taxonomy of birds of the world » 1990)
--	---